

PERIFER ARTERIESYGDOM



*I folkemunde også kaldet
for vindueskiggersyndrom,
åreforsnævring i benene og
åreforkalkning i benene.*

**Til dig som er i behandling
med Xarelto® for din
perifere arteriesygdom (PAD)**

Patientinformation



Indholdsfortegnelse

Hvorfor skal jeg behandles?	3
Minimering af risikoen	3
Hvorfor Xarelto®?	4
Hvad er Xarelto og acetylsalicylsyre?	4
Hvorfor skal jeg tage de to lægemidler sammen?	4
Hvordan virker Xarelto® og acetylsalicylsyre?	4
Sådan skal du tage Xarelto® og acetylsalicylsyre	5
Hvad skal jeg ellers vide om Xarelto®?	5
Bivirkninger	5
Patientkort	6
Hvad kan jeg ellers gøre?	6
Aftalekort	7

Bemærk: Denne brochure er ikke tænkt som en erstatning for de anbefalinger og anvisninger, som du får fra din læge eller andre sundhedspersoner. Læs også indlægssedlen omhyggeligt.

Om denne brochure

Kære patient

Du har fået denne brochure, fordi din læge har ordineret Xarelto til behandling af din perifer arteriesygdom, i folkemunde kaldet vindueskiggersyge, åreforsnævring i benene og åreforkalkning i benene. Denne brochure vil hjælpe dig med at forstå sygdommen og forklare dig, hvorfor det er vigtigt, at du tager din medicin.

Tal med lægen for at få mere information om din sygdom.


Hvorfor skal jeg behandles?

Perifer arteriesygdom (PAD) påvirker de blodkar i benene, der fører det iltede blod ud til væv og muskler. Disse blodkar kaldes arterier.

Sygdommen begynder, når der aflejres fedtstoffer i arterierne, og blodforsyningen til benene dermed hæmmes. Der vil opstå symptomer som bensmerter, når dine benmuskler har brug for mere ilt, end de får tilført løbende fra kroppen. Smerter opstår typisk, når du går en tur eller er aktiv.

Minimering af risikoen

Nogle gange dannes der blodpropper oven på fedtaflej-ringerne, så arterien blokeres og forhindrer blodet i at strømme frit. Hvis det sker, er det nødvendigt at operere for om muligt at genoprette blodgennemstrømningen. Hvis det ikke er muligt, kan man bliver nødt til at amputere benet. Heldigvis kan du og lægen samarbejde for at reducere risikoen for, at det sker.



4 Hvorfor Xarelto®?

Lægen har ordineret Xarelto i kombination med acetylsalicylsyre (Hjertemagnyl) som led i behandlingen af din perifere arteriesygdom for at reducere risikoen for, at der dannes en blodprop i dine arterier.

Hvad er Xarelto og acetylsalicylsyre?

Xarelto (rivaroxaban) er en såkaldt antikoagulant, dvs. et blodfortyndende lægemiddel. Det virker ved at fortynde blodet en lille smule og derved mindske risikoen for, at der dannes en blodprop. I lav dosis, 75 eller 100 mg dagligt, virker acetylsalicylsyre også blodfortyndende.


Hvorfor skal jeg tage de to lægemidler sammen?

Acetylsalicylsyre og Xarelto fortynder ikke blodet på samme måde (se næste side), og når de anvendes sammen, virker de bedre, end hvis de tages alene hver for sig. For at give den bedste beskyttelse skal lægemidlerne fortynde blodet præcis så meget, at det reducerer risikoen for, at der dannes en blodprop.


Kombinationen af Xarelto og acetylsalicylsyre reducerer risikoen for blodprop og evt. amputation.

Hvordan virker Xarelto® og acetylsalicylsyre?

Xarelto reducerer dannelsen af fibrin-net (det net, der danner blodproppen), mens acetylsalicylsyre reducerer aktiveringen af blodplader (de celler, der limer nettet sammen). På den måde samarbejder de to lægemidler om at reducere risikoen for, at der dannes en blodprop i arterierne.



Sådan skal du tage Xarelto® og acetylsalicylsyre



Du skal tage Xarelto to gange dagligt, samtidig med at du tager acetylsalicylsyre én gang dagligt. Her er et par tips til at huske at tage medicinen. Spiser du altid på bestemte tidspunkter? Eller er der noget, du ser på eller bruger to gange om dagen hver dag (f.eks. din tandbørste)? Mærkaten her ved siden af kan fastgøres til en hverdags-genstand for at minde dig om, at du skal tage din medicin.



Hvad skal jeg ellers vide om Xarelto®?

Bivirkninger

Ligesom andre lignende lægemidler kan Xarelto forårsage blødning, hvilket kan være farligt. Fortæl det øjeblikkeligt til lægen, hvis du oplever en eller flere af følgende bivirkninger:

- ♦ Langvarig eller kraftig blødning
- ♦ Usædvanlig svaghed, træthed, bleghed, svimmelhed, hovedpine, uforklarlig hævelse, åndenød, brystsmerte eller hjertekramper (angina pectoris), da det kan være tegn på blødning.

Du kan finde flere oplysninger om bivirkninger i indlægssedlen, der følger med lægemiddelpakningen.

Du må aldrig tage en dobbeltdosis af hverken Xarelto eller acetylsalicylsyre.

Hvis du glemmer en dosis, skal du springe denne over og tage næste dosis som planlagt.



6 Patientkort

Dit patientkort informerer sundhedspersoner om, at du tager blodfortyndende medicin. Vis det til læger, tandlæger eller sygeplejersker, som du behandles af, og hav det altid på dig (f.eks. i din tegnebog), så det er tilgængeligt i en eventuel nødsituation.

Hvad kan jeg ellers gøre?

Husk, at det er vigtigt, at du tager din medicin efter lægens anvisninger. Men du kan også beskytte dit hjerte på andre måder, f.eks. ved at:



Holde op med
at ryge



Dyrke
regelmæssig motion



Tab dig,
hvis du er overvægtig



Spise sundt

**Har du spørgsmål
om Xarelto? Tal med
din behandlende læge
eller sygeplejerske.**



[illegible]